

## تعريف بیماری :

سکته قلبی یا انفارکتوس میوکارد عبارت است از صدمه به قسمتی از عضله قلب، که بعلت انسداد در رگهای کرونری (رگهای تغذیه کننده عضله قلب) و از بین رفتن جریان خون در آن قسمت اتفاق می‌افتد لخته درون رگ کرونری جریان خون و اکسیژن رسانی به عضله قلبی را مختل می‌کند، که سبب مرگ سلولهای قلبی در آن ناحیه می‌شود. ماهیچه قلبی آسیب دیده توانایی خود برای انقباض از دست می‌دهد، و عضله قلبی باقیمانده برای جبران منطقه آسیب دیده وارد عمل خواهد شد. گاهی، استرس شدید ناگهانی می‌تواند یک حمله قلبی را شروع کند.

## علائم سکته قلبی :

بخی از شایع ترین علائم سکته قلبی عبارتند از: درد پشت جناق سینه (استخوان وسط سینه) یک علامت عمده حمله قلبی است که ممکن است دو دقیقه یا بیشتر طول بکشد ولی در بسیاری افراد، بخصوص در افراد مسن و بیماران دیابتی درد ممکن است ناچیز باشد یا حتی اصلاً وجود نداشته باشد.

غلب درد از ناحیه سینه به بازوها یا شانه، گردن، فک، شکم یا پشت انتشار می‌یابد. گاهی اوقات درد تنها در یکی از این نواحی احساس می‌شود. درد ممکن است شدید و زیاد یا خفیف و نامشخص باشد. درد به صورتهای زیر احساس می‌شود:


۱. فشار و سنگینی در قفسه سینه و احساس درد در معده
۲. درد شدید در دست

۴. در صورتی که بیمار، دچار تنگی تنفس است، وی را در وضعیت نشسته قرار دهید و پاهایش را از تخت آویزان کنید.

۵. در صورتی که بیمار، دچار افت فشار خون است وی را در وضعیت خوابیده قرار دهید و پاهایش را بالاتر از سطح بدن نگهدازید. لباس‌های اطراف گردن و قفسه سینه را شل کنید.

۶. انتقال هر چه سریع تر بیمار به مراکز درمانی با آمبولانس یا وسیله شخصی نکته بسیار مهمی است، بنابراین سعی کنید در این موارد، زمان را از دست ندهید.

۷. اگر بیمار بی هوش باشد سعی کنید عملیات احیاء قلبی عروقی را به درستی برایش اجرا نمایید.



۳ - تهوع، استفراغ یا تعزیق سرد می‌تواند با درد همراه باشد

۴ - اضطراب و غش کردن

## عوامل خطر سکته قلبی :

مهمترین عوامل خطر سکته قلبی عبارتند از:

۱. سیگار
۲. فشار خون بالا
۳. چربی زیاد رژیم غذایی
۴. کنترل نامناسب کلسترول خون
۵. بیماری قند خون
۶. جنس مذکور (سکته قلبی در مردان بیشتر است)
۷. سن، احتمال سکته قلبی با افزایش سن بیشتر می‌شود
۸. وراثت
۹. اضافه وزن

## کمک‌های اولیه در مواجهه با بیماری سکته قلبی :

۱. حتی المقدور بیمار را از هرگونه فعالیت اضافی مانند راه رفتن، دویدن، صعود از پلکان و ... باز دارید و وی را در وضعیت استراحت کامل قرار دهید.

۲. سعی کنید بر روحیه خود مسلط باشید و تمامی تلاش خود را برای کاهش اضطراب بیمار بکار بیندید. از سر و صدا کردن، گریه و سایر مواردی که باعث اضطراب بیشتر بیمار می‌شود خودداری کنید.

۳. از دادن خوراکی و آشامیدنی به بیمار اجتناب کنید.



سکته قلبی یا  
افکار کتوسی میتوارد

آرزوی بهبود، سلامتی و تدرستی خانواده هاست.



پیشرو در ارائه خدمات نوین پزشکی  
پیمارستان بهبود

منابع :  
درسنامه طب اورژانس

زیر نظرسروپرست علمی گروه اورژانس :  
دکتر علی زینالی متخصص طب اورژانس  
تهیه کنندگان :

کارگروه آموزش به بیمار

تاریخ تهیه : شهریور ۱۳۹۵

تاریخ بازنگری : مهرماه ۱۳۹۹

### ارتباط با ما :

سامانه تلفن ۵ رقمی : ۳۱۵۵۵

سامانه پیام کوتاه : +۹۸۱۰۰۳۱۵۵

تلفن : ۰۴۱-۳۵۵۳۸۲۷

فاکس : ۰۴۱-۳۵۵۶۶۲۲۷

ایمیل : [info@behboud.com](mailto:info@behboud.com)

وب سایت : [www.Behboud.com](http://www.Behboud.com)

آدرس : تبریز / خیابان ارشاد جنوبی  
نرسیده به چهارراه باغ شمال / بیمارستان بهبود

### پیشگیری از سکته قلبی :

۱. استفاده از رژیم های غذایی کم نمک و سبزیجات و میوه

۲. اجتناب از مصرف غذاهای پر چرب و سرخ شده و روغن با کلسترول بالا

۳. انجام ورزش و فعالیت بدنی یکی از راههای مهم پیشگیری از سکته قلبی است که باید در تمام سنین انجام شود

۴. اجتناب از مصرف غذاهای حاضری و موادی مانند سوسیس و کالباس و نوشابهای گازدار تا حد امکان.

### اقدامات درمانی برای بیمار سکته قلبی :

حمله قلبی یک اورژانس پزشکی است، بسته و احتمالاً مراقبتهای ویژه زیر نظر پزشک مورد نیاز است. پایش مداوم نوار قلب سریعاً آغاز می شود، زیرا ضربانات نامنظم قلبی مهمترین علت مرگ در چند ساعت اول پس از حمله قلبی هستند. عمولاً اکسیژن تجویز می شود، حتی اگر اکسیژن خون طبیعی باشد. این امر اکسیژن کافی در اختیار بافتهای بدن می گذارد و کار قلب را کم میکند. نیترو گلیسرین وریدی یا سایر داروها برای کنترل درد و کاهش نیاز قلب به اکسیژن بکار می روند. داروهای ضد دردهای ممکن است برای یک حمله قلبی تجویز شوند.